

This discussion paper is/has been under review for the journal Atmospheric Chemistry and Physics (ACP). Please refer to the corresponding final paper in ACP if available.

Modelling the chemistry and transport of bromoform within a sea breeze driven convective system during the SHIVA Campaign

P. D. Hamer¹, V. Marécal¹, R. Hossaini², M. Pirre³, N. Warwick⁴, M. Chipperfield², A. A. Samah^{5,6}, N. Harris⁴, A. Robinson⁴, B. Quack⁷, A. Engel⁸, K. Krüger⁷, E. Atlas⁹, K. Subramaniam¹⁰, D. Oram¹¹, E. Leedham¹¹, G. Mills¹¹, K. Pfeilsticker¹², S. Sala⁸, T. Keber⁸, H. Bönisch⁸, L. K. Peng¹³, M. S. M. Nadzir¹⁴, P. T. Lim¹⁵, A. Mujahid¹⁵, A. Anton¹⁶, H. Schlager¹⁷, V. Catoire³, G. Krysztofiak³, S. Fühlbrügge⁷, M. Dorf¹², and W. T. Sturges¹¹

¹Centre National de Recherches Météorologiques-Groupe d'étude de l'Atmosphère Météorologique, Météo-France and CNRS, UMR3589, Toulouse, France

²The Institute for Climate & Atmospheric Science, School of Earth and Environment, University of Leeds, Leeds, UK

³Laboratoire de Physique et Chimie de l'Environnement et de l'Espace, CNRS and University of Orléans, UMR7328, Orléans, France

[Title Page](#)

[Abstract](#)

[Introduction](#)

[Conclusions](#)

[References](#)

[Tables](#)

[Figures](#)

[◀](#)

[▶](#)

[◀](#)

[▶](#)

[Back](#)

[Close](#)

[Full Screen / Esc](#)

[Printer-friendly Version](#)

[Interactive Discussion](#)

